

Mural “Tesoros Silvestres”



Quinara - Loja - Ecuador
2026

Infografía de Divulgación Biocultural

Sobre las Especies Representadas
Artísticamente en el Mural.



Momot

Momotus aequatorialis

Barranquero Andino

Distribución:

Andes de Colombia, Ecuador, Perú y norte de Bolivia.
Habita bosques montanos húmedos, bordes de bosque, bosques secundarios y zonas cercanas a quebradas y arroyos.

Tamaño:
46 - 48 cm

Alimentación:

Insectos, arañas, pequeños vertebrados y frutos silvestres.

Familia:
Momotidae

Reproducción:

Anida en madrigueras excavadas en barrancos o taludes.
Pone 3 huevos, incubados por ambos padres durante aproximadamente 3 semanas.

Características:

- ★ Caza desde una percha, lanzándose al suelo o entre la vegetación para capturar presas.
- ★ Suele observarse solitario o en parejas.
- ★ En estado de alerta, balancea la cola de un lado a otro.
- ★ Sus largas plumas caudales terminadas en forma de raqueta son su rasgo más distintivo.

Rol Ecológico:

Control de insectos y dispersión de semillas.



Colibrí de Loja

Amazilis amazilia

Quinde

Familia:
Trochilidae

Reproducción:

Cría durante todo el año.
Pone 2 huevos blancos con una incubación de 16–18 días.

Características:

- ★ El macho defiende territorios de alimentación.
- ★ La hembra construye un pequeño nido en forma de copa con fibras vegetales y telarañas.
- ★ Se reconoce por su vuelo rápido y zigzagueante entre las flores, su rasgo más distintivo.

Alimentación:

Se alimenta principalmente de néctar y complementa su dieta con pequeños insectos y arañas.

Distribución:

Habita ambientes abiertos y secos del oeste de Ecuador y Perú, incluyendo matorrales, bosques espinosos y zonas semiáridas.

Bejaria

Es un arbusto o pequeño árbol de hojas perennes y flores muy vistosas, que pueden ser blancas, rosadas o rojas. Algunas especies tienen flores fragantes. Se encuentra en diferentes regiones de América, incluyendo Ecuador.

Tamaño:
9 - 11 cm

Rol Ecológico:

Importante polinizador de plantas nativas.



Soterrey Ondeado

Campylorhynchus fasciatus

Sucaca

Familia:

Troglodytidae

Reproducción:

Nidificación cooperativa en grupos familiares.
Una pareja reproductora dominante.
Entre 3 y 4 huevos.
Incubación de ~17 días.

Características:

- ★ Machos y hembras son similares.
- ★ Descansa en grupo dentro de los nidos.
- ★ Su canto sirve para defender el territorio y comunicarse con otros individuos.

Alimentación:

Principalmente insectos y otros invertebrados.
Complementa su dieta con materia vegetal.

Distribución:

Oeste de Ecuador y noroeste de Perú.
Habita bosques secos, matorrales y zonas semiáridas.

Tamaño:

~20 cm

Rol Ecológico:

Ayuda a controlar poblaciones de insectos y mantener el equilibrio del bosque seco.



Aguila Andina

Spizaetus isidori

Gavilán Cachudo o Ugabanga

Familia:

Accipitridae

Tamaño:

65–80 cm de altura
Hasta 180 cm
de envergadura.

Reproducción:

Cría un solo pichón al año.

Características:

- ★ Vuelo potente y maniobras acrobáticas.
- ★ Las hembras son más grandes que los machos.
- ★ Estado de Conservación:
En Peligro Crítico (CR) en Ecuador.

Rol Ecológico:

Depredador tope que regula poblaciones de otras especies y contribuye al equilibrio de los ecosistemas andinos. Su presencia indica bosques saludables y bien conservados.

Alimentación:

Caza principalmente aves y mamíferos de tamaño mediano.

Distribución:

Habita los bosques nublados y montanos de los Andes. En Ecuador se la encuentra entre los 1.500 y 3.500 m de altitud.



Turpial Coliamarillo

Icterus mesomelas

Chiroca

Familia:

Icteridae

Rol Ecológico:

Control de insectos, dispersión de semillas y polinización ocasional.

Tamaño:

22 - 23 cm

Alimentación:

Insectos y otros invertebrados, frutos, bayas y néctar.

Abeja melífera

Es un insecto social que vive en colonias y se alimenta de néctar y polen. Es muy importante para la polinización de las plantas y produce miel y cera.



Reproducción:

Construye un nido colgante en forma de bolsa tejido con fibras vegetales. Pone aproximadamente 3 huevos; la incubación dura unos 14 días. Ambos padres alimentan a los pichones.

Distribución:

Desde América Central hasta el norte de Sudamérica. Habita bosques secos y húmedos, matorrales arbolados, bosques secundarios, plantaciones y áreas cercanas al agua.

Características:

- ★ Residente (no migratorio).
- ★ Forrajea en parejas o pequeños grupos.
- ★ Frecuenta vegetación densa y zonas cercanas al agua.
- ★ Destaca por su plumaje amarillo brillante y negro.



Perico Caretirrojo

Psittacara erythrogenys

Periquito de Máscara Roja

Familia:
Psittacidae

Tamaño:
30 - 33 cm

Distribución:

Suroeste de Ecuador y norte de Perú. Habita bosques secos, matorrales, áreas agrícolas y zonas urbanas con árboles.

Alimentación:

Se alimenta de frutos, semillas, flores, brotes tiernos y néctar ocasional.

Características:

- ★ Máscara facial de color rojo intenso.
- ★ Patas adaptadas para trepar, con dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás.
- ★ Suele observarse en parejas o bandadas.
- ★ Emite fuertes chillidos para comunicarse.

Reproducción:

Forma parejas monógamas. Anida en cavidades de árboles. Pone entre 2 y 4 huevos. Incubación de aproximadamente 24 días.

Rol Ecológico:

Contribuye a la dispersión de semillas y a la regeneración de los bosques secos.



Mochuelo del Pacífico (Peruano)

Glaucidium peruanum

Búho

Familia:
Strigidae

Tamaño:
15-18 cm

Distribución:
Región Andina Occidental
En Ecuador: Bosques
secos y húmedos
tropicales, bosques
montanos y matorrales
interandinos de la Costa
y la región Andina.

Características:

- ★ Actividad crepuscular y diurna.
- ★ Se adapta a espacios humanos como jardines y plazas, si encuentra cavidades para anidar.

Alimentación:
Pequeños
vertebrados e
invertebrados.

Reproducción:
Pone entre 2 y 4 huevos,
con incubación de 19 a 21
días (característico del
género Glaucidium).

Faique
Es un árbol espinoso que
puede superar los 4 metros
de altura y se adapta a
climas secos. Tiene flores
amarillas y frutos en forma
de vaina. Crece en
barrancos, terrenos de
cultivo, laderas y cerros, y
florece principalmente
durante la época de lluvias.

Rol Ecológico:
Depredador de
control biológico.
Regula poblaciones
de insectos y
pequeños
vertebrados.



Fuentes Consultadas para la creación del Mural y la Infografía



- **Saberes Locales de la Comunidad**

Información y conocimientos compartidos por habitantes de la comunidad de Quinara.

- **Sobre Quinara**

<https://quinara.gob.ec/>

<https://www.loja.gob.ec/contenido/quinara>

- **Plan de Desarrollo Territorial - Quinara**

<https://quinara.gob.ec/pdot/0/>

- **Momot**

bioweb.bio: Arzuza, D. & Olmedo, I 2019. Momotus aequatorialis En: Freile, J. F., Poveda, C. 2019. Aves del Ecuador. Version 2019.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

<https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Momotus%20aequatorialis>, acceso Lunes, 15 de Junio de 2026.

Wikipedia.org : https://es.wikipedia.org/wiki/Momotus_aequatorialis

ebird.org: <https://ebird.org/species/higmot1?siteLanguage=es>

birdsoftheworld.org/: <https://birdsoftheworld.org/bow/species/higmot1/cur/introduction?lang=es>

birdscolumbia.com: <https://birdscolumbia.com/2016/03/18/barranquero-coronado>

Xeno Canto: xeno-canto.org: <https://xeno-canto.org/species/Momotus-aequatorialis>

- **Colibrí de Loja**

Ecología reproductiva del colibrí de Loja Amazilis amazilia alticola (Apodiformes: Trochilidae) en Loja, Ecuador:

https://www.researchgate.net/publication/395018935_Ecologia_reproductiva_del_colibri_de_Loja_Amazilis_amazilia_alticola_Apodiformes_Trochilidae_en_Loja_Ecuador

Wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/Amazilia_hummingbird

ebird.org: <https://ebird.org/species/amahum1?siteLanguage=es>

birdsoftheworld.org: <https://birdsoftheworld.org/bow/species/amahum1/cur/introduction?lang=es>

animalia.bio: <https://animalia.bio/es/amazilia-hummingbird>

- **Bejaria**

<https://es.wikipedia.org/wiki/Bejaria>

- **Soterrey Ondeadó**

ebird.org: <https://ebird.org/species/faswre1>

birdsoftheworld.org: <https://birdsoftheworld.org/bow/species/faswre1/cur/introduction?lang=es>

avesdeperu.org: <https://avesdeperu.org/troglodytidae/cucarachero-ondeado-campylorhynchus-fasciatus/>

exploraves.com: <https://exploraves.com/2020/10/13/la-sucaca-cucarachero-ondeado>

- **Águila Andina**

E-BOOK: Monar-Barragán, Paul & Astudillo-Abad, Nicolás & Restrepo-Cardona, Juan & Araujo, Evelyn & Lopez, Joceline & Angulo, Pablo & Cadena, Belén & Kohn, Sebastian & Narváez Ponce, Leonardo. (2025). Plan de Conservación del Águila Andina (Spizaetus isidori), el principal depredador aéreo del Corredor Sangay -Podocarpus.

https://www.researchgate.net/publication/390695225_Plan_de_Conservacion_del_Aguila_Andina_Spizaetus_isidori_el_principal_depredador_aereo_del_Corredor_Sangay_Podocarpus

ebird.org: <https://ebird.org/species/baceag2>

birds of the world: <https://birdsoftheworld.org/bow/species/baceag2/cur/introduction?login>

Fuentes Consultadas para la creación del Mural y la Infografía



- **Turpial Coliamarillo**

Bbioweb.bio: Freile, J. F., Poveda, C. 2019. *Icterus mesomelas* En: Freile, J. F., Poveda, C. 2019. Aves del Ecuador. Version 2019.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Icterus%20mesomelas>, acceso Lunes, 15 de Junio de 2026.

ebird.org: <https://ebird.org/species/yetori1?siteLanguage=es>

birdsoftheworld.org: <https://birdsoftheworld.org/bow/species/yetori1/cur/introduction?lang=es>

Xeno Canto: xeno-canto.org: <https://xeno-canto.org/explore?query=Icterus%20mesomelas>

wikipedia.org: https://es.wikipedia.org/wiki/Icterus_mesomelas

birdscolombia.com: <https://birdscolombia.com/2020/03/25/turpial-coliamarillo-yellow-tailed-oriole-icterus-mesomelas/>

- **Perico Caretirrojo**

bioweb.bio: Freile, JF, Poveda, C. 2019. *Eritrogenia de Psittacara* En: Freile, JF, Poveda, C. 2019. Aves del Ecuador. Versión 2019.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Psittacara%20erythrogenys>, acceso Lunes, 15 de Junio de 2026.

Wikipedia.org: https://es.wikipedia.org/wiki/Psittacara_erythrogenys

ebird.org: <https://ebird.org/species/rempar?siteLanguage=es>

birdsoftheworld.org: <https://birdsoftheworld.org/bow/species/rempar/cur/introduction?login>

- **Mochuelo del Pacífico (Peruano)**

bioweb.bio: Freile, J. F., Poveda, C. 2019. *Glaucidium peruanum* En: Freile, J. F., Poveda, C. 2019. Aves del Ecuador. Version 2019.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Glaucidium%20peruanum>, acceso Martes, 26 de Mayo de 2026.

Wikipedia.org: https://es.wikipedia.org/wiki/Glaucidium_peruanum

Ebird: ebird.org: <https://ebird.org/species/pepowl1>

Gbif: gbif.org: <https://www.gbif.org/species/523209>

birdsoftheworld.org: <https://birdsoftheworld.org/bow/species/pepowl1/cur/introduction?lang=es>

- **Faique (Vachellia macracantha)**

https://es.wikipedia.org/wiki/Vachellia_macracantha

NOTA

Esta infografía es un material de divulgación biocultural con un enfoque artístico, claro y accesible. Busca acercar el conocimiento y fortalecer la conexión entre las personas y la naturaleza. No constituye educación formal ni reemplaza las fuentes científicas especializadas.

Conoce más sobre el Proyecto Arte Huella Silvestre
www.HuellaSilvestre.com